

Vaccinations- reaktioner hos hund!

I Sverige vaccinerar vi rutinmässigt mot valpsjuka, smittsam hepatit (HCC), parvo och kennelhosta (parainfluenza), alltså DHPPi. De tre förstnämnda är mycket allvarliga och ofta dödliga sjukdomar. Som tur är, är vaccinerna effektiva och ger ett gott skydd. Men i områden eller populationer där vaccinationsgraden går ned och det finns ett ökande antal ovaccinerade hundar dyker sjukdomarna upp igen.

Kennelhostevaccin är inte fullt så effektivt men gör att sjukdomsförloppet blir mildare och med kortare förlopp. Som med vår influensa kan viruset se lite olika ut år från år och därför kan vaccinet även fungera bättre och sämre.

Vaccinerna är levande, försvagade virusstammar som skall reta immunförsvaret att producera antikroppar. Överkänslighetsreaktioner beror inte på själva viruset, utan på de övriga ämnen i vaccinet (adjuvans) som tillsatts för att stimulera immunförsvaret.

Överkänslighetsreaktioner sker allra oftast vid den andra valpvaccinationen, alltså den som ges vid 12-13 veckors ålder. Det finns förstås en väldigt stor spännvidd på vad som kan hända. Milda reaktioner som lite ömhet vid injektionsplatsen eller en lindrig tempförhöjning och slöhet ett par dagar räknas som förväntade reaktioner och är helt ofarliga. Oftast märks dock ingenting.



En allvarligare grad av reaktion är de fall hunden (vanligtvis en valp då) svullnar upp i ansiktet inom någon timme efter vaccination. Oftast går detta över på några timmar. Om valpen inte mår uppenbart dåligt eller är kraftigt svullen behöver man inte göra något. Annars kan man ge korttidsverkande kortison eller antihistamin. Ett annat symptom kan vara övergående slöhet och någon kräkning.

Den allvarligaste reaktionen är anafylaktisk chock då hunden helt kollapsar, oftast ganska omgående efter injektion. I dessa fall krävs akuta insatser med adrenalin, intravenöst dropp och antihistamin.

De riktiga kollapserna är som tur är mycket sällsynta. Jag har aldrig varit med om någon. De av de lindrigare fallen med svullnad eller kräkningar ser vi kanske 3-4 fall per år på min klinik. Då vaccinerar vi över 100 hundar per månad. Inte alla valpar förstås.

Det man kan tänka på för att minska risken för reaktioner, och ge bättre effekt av vaccinet, är att inte ge ytterligare vacciner samtidigt, t.ex rabies eller leptospiros. I alla fall inte på unga djur.

På frågan om man ska vaccinera en hund igen som reagerat som valp så skulle jag säga – vid lindriga reaktioner ja, vid allvarliga reaktioner; prata med din veterinär.



Per Bransell, Leg.vet

Specialist i hundens och kattens sjukdomar

Arken Zoo Veterinärklinik Falun